

Grovnålsbiopsi - anvisning för eftervård

Vi har tagit provbitar från Ert bröst _____.20_____.

Efter lokalbedövning har vi med en kniv gjort ett litet snitt i Ert bröst och tagit flera vävnadsprov med en grov skärande nål.

Anvisning för eftervård

När effekten av bedövningsmedlet upphör, kan bröstet kännas ömt i flera dagar. Det är också vanligt med blåmärken som kan hållas t.o.m. i flera veckor.

Vid behov kan Ni ta värkmediciner som t.ex. Panadol® eller Burana®.
Undvik mediciner som ökar risken för blödning (ex. Disperin®, Asperin®).

För att minska inflammationsrisken ska Ni undvika att duscha bröstet under ett dygn eller gå i bastun 2 dygn efter ingreppet. Undvik också att lyfta tungt. Det är bra att låta de lagda förbanden vara på som skydd i åtminstone ett dygn. Det understa plåstret kan Ni låta vara så länge det hålls på plats. Vanligtvis blöder stickstället inte efteråt, men om det börjar kännas fuktigt, ska Ni öppna förbanden och trycka hårt på det blödande stället tills blödningen upphör.

Det tar flera dagar, ibland veckor, att undersöka provbitarna som tagits.

Svaret får Ni från den remitterande polikliniken, antingen via telefon eller på den överenskomna mottagningstiden.

Vid behov kan Ni kontakta den egna hälsovårdscentralen eller röntgenavdelningen på MÖCS
tel. 040 653 4223.