

## Vävnadsprov som komplement till mammografiundersökningen

Vi har reserverat tid åt Er för tagning av vävnadsprov \_\_\_/\_\_\_ 20\_\_ klo \_\_\_\_.

Anmäl Er vid röntgenavdelningens kansli på Mellersta Österbottens Centralsjukhus.

### För att undersökningen skall lyckas, krävs följande förberedelser:

På undersökningdagen får Ni äta normalt och ta Era mediciner. **Blodförtunnande mediciner får ni inte ta** på undersökningdagen och inte heller dagen därpå p.g.a. blödningsrisken.

Vi har Era gamla mammografibilder är tillgängliga, men ofta behöver vi ändå ta tilläggsbilder. Om Ni har gamla mammografibilder kan Ni ta dem med Er.

### Undersökningens förlopp

Provtagningen sker antingen med hjälp av ultraljud eller med mammografiapparaten. När provtagningarna görs med hjälp av ultraljud ligger Ni på undersökningbordet medan man med ultraljud lokaliserar de vävnadsförändringar som man kan ta prover från, antingen prov med fin nål (finnålsbiopsi) eller i lokalbedövning prov med grov nål (grovnålsbiopsi). När provtagningarna görs med mammografiapparaten, sitter Ni bredvid apparaten och förändringarna lokaliserar med hjälp av mammografibilder. Det område därifrån proven ska tas bedövas och därefter tas flera prov.

### Eftervård

Efter **finnålsbiopsi** behövs ingen eftervård. Plåstret kan avlägsnas efteråt och området därifrån provet tagits får tvättas redan samma dag.

Efter **grovnålsbiopsi** trycker skötaren på stickstället i ca.10 minuter. Blödningen är oftast liten. Det är bra att låta de förband som lagts om bröstet vara på i ett par dagar. Men om området börjar hetta eller kännas fuktigt och Ni misstänker att bröstet blöder, är det skäl att öppna bandagen och trycka hårt på det blödande stället. Ni kan också kontakta den egna hälsovårdscentralen eller vår röntgenavdelning.

Vid grovnålsbiopsi gör man ett litet snitt i huden, genom vilket man tar flera prov. Efteråt är det mycket vanligt med blåmärken, som kan synas till och med i flera veckor. Det är också vanligt att det undersökta området blir ömt. Som värkmedicin kan Ni ta Burana eller Panadol, men INTE Asperin eller Disperin vilka ökar risken för blödning.

På undersökningdagen ska Ni undvika att lyfta tungt. Ett dygn efter ingreppet ska Ni undvika att duscha bröstet eller gå i bastun. Vid behov kan Ni vända Er till den remitterande enheten och anhålla om sjukledighet.

### Resultatet av undersökningen

Proverna skickas till laboratoriet och inom ett par veckor får den remitterande läkaren resultatet.

Polikliniken reserverar en mottagningstid åt Er där Ni får höra resultatet av undersökningen.

Om den reserverade tiden inte passar Er, eller om Ni har frågor angående undersökningen, ber vi Er kontakta röntgenavdelningen mellan klockan 8.00 och 15.00. Tel. 040 653 4223. Tidsreserveringen måste annulleras senast två vardagar innan den reserverade tiden. Vi debiterar en avgift för



Ihminen keskiössä  
Individen i centrum

Radiologia

POTILASOHJE | PATIENTFÖRESKRIFT

040 653 4223

oannullerade undersökningstider, den fastställs i enlighet med kundavgiftslagen. Den aktuella avgiften anmäls på sjukhusets internetsidor.