

Magnetundersökning

Vi har reserverat tid åt dig för magnetundersökning vid MÖCS

____/____ 20____ klo _____

Du bör komma till MÖCS magnetavdelning 15 min före undersökningstiden.

Magnetavdelningen finns på våning 00 under den psykiatriska enheten. Följ den gröna tejen på golvet, så hittar du fram. På avdelningen finns ingen sekreterare som tar emot dig. Därför kan du sitta och vänta i magnetavdelningens väntrum. Röntgenskötaren kommer och hämtar dig när det blir din tur.

Då du kommer till undersökningen får du inte vara kraftigt sminkad eller ha mycket hårspray. Lämna alla smycken och piercings hemma eller avlägsna dem före undersökningen. Läkemedelsplåster och glukosmätare tas bort vid magnetundersökningen, det är därför onödigt att byta till nytt plåster / mätare innan undersökning.

Under undersökningen ligger du på rygg i en ljus väl ventilerad "tunnel". Det hörs ett kraftigt knackande ljud från undersökningsapparaten, varför du får hörlurar. Via hörlurarna kan du om du vill lyssna på musik under undersökningen (du kan ta med en egen CD-skiva). Vid vissa undersökningar används kontrastmedel, som ges i armbågens ven. Undersökningen tar $1/2$ -1 timme inklusive förberedelserna.

För din säkerhets skull, är det viktigt att du svarar på följande frågor:

Ja Nej

- | | | |
|--------------------------|--------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Har du pacemaker? |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Har du protes i innerörat eller en smärtpump? |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Har du metalldelar eller - flisor i kroppen?
(t.ex. proteser, operationsclips, granatskärvor, metallskärvor i ögat) |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Har du blivit opererad i hjärtat eller huvudet? |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Känner du rädsla i trånga utrymmen? |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Är du gravid? |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Har du tatueringar? (kräver inte att du ringer i förväg) |
- Din vikt är _____ kg

Om du svarade JA på någon av frågorna, kontakta magnetavdelningen så fort som möjligt, dock senast två dagar före undersökningen. Tel. 040 653 4229 eller tel. 040 653 4223 vardagar klo 9-15. Tidsreserveringen måste annulleras senast två vardagar innan den reserverade tiden. Vi debiterar en avgift för oannullerade undersökningstider, den fastställs i enlighet med kundavgiftslagen. Den aktuella avgiften anmäls på sjukhusets internetsidor.

Karleby ____/____ 20____

underskrift

Ta med dig denna blankett ifylld då du kommer till undersökningen.

Magnetundersökning av ändtarmen

För att undersökningen skall lyckas, krävs följande förberedelser:

Köp på apoteket tömningsmedlet, Toilax® -kombinationsförpackning, som innehåller 4 tabletter och en rektal lösning (ett lavemang).

Dagen före undersökningen:

- Ät en lätt kost.
- Ta 2 Toilax® -tabletter under lunchtiden och 2 Toilax® -tabletter på kvällen före du går och lägger dig.

På undersökningsdagen

- Spruta ett Toilax® -lavemang i ändtarmen på morgonen.
- Du får inte äta eller dricka på 4 timmar före undersökningen.
- Regelbundna ordinerade mediciner får du ta, med en liten mängd vatten.
- **OBS!** Diabetiker med insulinbehandling, kontakta vid behov din diabetesskötare.

På röntgenavdelningen får du ta på er sjukhuskläder. Före du går in i magnetrummet måste du ta bort alla metallsaker såsom klocka, telefon, smycken, nycklar, bank- och kreditkort. Sakerna får du lämna i ett låst skåp.

Utförande av undersökningen

Undersökningen tar ca 1-2 timmar. Före undersökningen börjar, fylls ändtarmen med en gelblandning och i armbågsveckets ven sätts en kanyl (som när blodprov tas). Via kanylen sprutas ett läkemedel (Buscopan) som gör att tarmens rörelser avmattas, senare ges dessutom kontrastmedel (Gadolinium) via kanylen.

Vid undersökningen ligger du på rygg i magnetunneln. Vid undersökningen tas många olika bildserier. När undersökningen är klar tas kanylen bort.

Observera:

Efter undersökningen kan du dricka och äta normalt. Du bör även reservera tid för tarmtömning efteråt. Kontrastmedlet utsöndras däremot via urinen. Utlåtandet av undersökningen får du av den egna läkaren.