

## Magnetundersökning

Vi har reserverat tid åt dig för magnetundersökning vid MÖCS

\_\_\_\_/\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ klo \_\_\_\_\_

Du bör komma till MÖCS magnetavdelning 15 min före undersökningstiden.

Magnetavdelningen finns på våning 00 under den psykiatriska enheten. Följ den gröna tejpén på golvet, så hittar du fram. På avdelningen finns ingen sekreterare som tar emot dig. Därför kan du sitta och vänta i magnetavdelningens väntrum. Röntgenskötaren kommer och hämtar Er när det blir Er tur.

Då du kommer till undersökningen får du inte vara kraftigt sminkad eller ha mycket hårspray. Lämna alla smycken och piercings hemma eller avlägsna dem före undersökningen. Läkemedelsplåster och glukosmätare tas bort vid magnetundersökningen, det är därför onödigt att byta till nytt plåster / mätare innan undersökningen.

Under undersökningen ligger du på rygg i en ljus väl ventilerad "tunnel". Det hörs ett kraftigt knackande ljud från undersökningsapparaten, varför du får hörlurar. Via hörlurarna kan du om du vill lyssna på musik under undersökningen (du kan ta med en egen CD-skiva). Vid vissa undersökningar används kontrastmedel, som ges i armbågens ven. Undersökningen tar  $\frac{1}{2}$ -1 timme inklusive förberedelserna.

### För din säkerhets skull, är det viktigt att du svarar på följande frågor:

Ja Nej

- Har du pacemaker?
- Har du protes i innerörat eller en smärtpump?
- Har du metalldelar eller -flisor i kroppen?  
(t.ex. proteser, operationsclips, granatskärvor, metallskärvor i ögat)
- Har du blivit opererad i hjärtat eller huvudet?
- Känner du rädsla i trånga utrymmen?
- Är du gravid?
- Har du tatueringar? (kräver inte att du ringer i förväg)

Din vikt är \_\_\_\_\_ kg

Om du svarade JA på någon av frågorna, kontakta magnetavdelningen så fort som möjligt, dock senast två dagar före undersökningen. Tel. 040 653 4229 eller tel. 040 653 4223, vardagar klo 9–15. Tidsreserveringen måste annulleras senast två vardagar innan den reserverade tiden. Vi debiterar en avgift för oannullerade undersökningstider, den fastställs i enlighet med kundavgiftslagen. Den aktuella avgiften anmäls på sjukhusets internetsidor.

Karleby \_\_\_\_/\_\_\_\_ 20\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
underskrift

**Ta med dig denna blankett ifylld då gu kommer till undersökningen.**

**GROVNÅLSBIOPSI AV BRÖSTET MED HJÄLP AV MAGNETUNDERSÖKNINGSAPPARAT (MRI)****För att undersökningen skall lyckas, krävs följande förberedelser:**

På undersökningdagen får du äta normalt och ta dina mediciner, men **INTE BLODFÖRTUNNANDE MEDICINER**. De blodförtunnande medicinerna får du p.g.a. blödningsrisken inte ta på undersökningdagen och inte heller dagen därpå. Om du äter **Primaspan®**, **Disperin®** eller **Asperin®** bör du hålla en paus med medicinen 3-4 dagar före undersökningen. På detta sätt minimeras efterblödningen.

Om du har medicinerna **Marevan®** eller **Plavix®**, vilka påverkar blodets koaguleringsförmåga, bör du inför provtagningen diskutera ett eventuellt uppehåll i medicineringen med din läkare. Vid användning av marevanläkemedel får blodets tromboplastintid (P-INR) vara högst 1,5 på provtagningdagen.

Ifall du vet om att du är allergisk mot kontrast- eller bedövningsmedel, bör du meddela detta åt personalen på magnetavdelningen före undersökningen. Om du har gamla mammografibilder eller MRI-bilder av bröstet, kan du ta dem med dig.

**Undersökningens förlopp**

Reservera ca 2 timmar för undersökningen. Före undersökningen sätter man en kanyl i dit armbågsveck. Via venkanylen ges under bildtagningen ett kontrastmedel. Efter att man med hjälp av MRI-bilderna lokaliserat förändringen, tar man vävnadsprovet i lokalbedövning. Under ingreppet och bildtagningen ligger du på mage på undersökningsbordet.

**Eftervård**

Efter ingreppet trycker skötaren på stickstället i ca 10 minuter. Blödningen är oftast liten. Det är bra att låta de förband som lagts om bröstet vara på i ett par dagar. Men om området börjar hetta eller kännas fuktigt och du misstänker att bröstet blöder, är det skäl att öppna bandagen och trycka hårt på det blödande stället. Vid behov kan du kontakta den egna hälsovårdscentralen eller vår MRI-enhet.

Under ingreppet gör man ett litet snitt i huden, genom vilket man tar flera vävnadsprov. Efteråt är det mycket vanligt med blåmärken, som kan synas till och med i flera veckor. Det är också vanligt att det undersökta området blir ömt. Som värkmedicin kan du ta **Burana®** eller **Panadol®**, men **INTE Asperin®** eller **Disperin®** vilka ökar risken för blödning.

På undersökningdagen ska du undvika att lyfta tungt. Ett dygn efter ingreppet ska du undvika att duscha bröstet eller gå i bastun. Vid behov kan du vända dig till den remitterande enheten och anhålla om sjukledighet.

**Resultatet av undersökningen**

Proverna skickas till laboratoriet och inom ett par veckor får den remitterande läkaren resultatet. Polikliniken reserverar en mottagningstid åt dig där du får höra resultatet av undersökningen.