

### Grovnålsbiopsi - anvisning för eftervård

Vi har tagit provbitar från ditt bröst \_\_\_\_ . \_\_\_\_ . 20 \_\_\_\_

Efter lokalbedövning har vi med en kniv gjort ett litet snitt i ditt bröst och tagit flera vävnadsprov med en grov skärande nål. Ingreppet gjordes med hjälp av magnetundersökningsapparaten.

#### Anvisning för eftervård

När effekten av bedövningsmedlet upphör kan bröstet kännas ömt i flera dagar. Det är också vanligt med blåmärken som kan hållas t.o.m. i flera veckor.

Vid behov kan du ta värkmediciner som t.ex. **Panadol®** eller **Burana®**.

Undvik mediciner som ökar risken för blödning (t.ex. **Disperin®**, **Asperin®**).

För att minska inflammationsrisken ska du under det första dygnet efter ingreppet undvika att duscha bröstet och bastun bör ni undvika i 2 dygn. Det är bra att låta de lagda förbanden vara på som skydd i åtminstone ett dygn. Det understa plåstret kan du låta vara så länge det hålls på plats. Vanligtvis blöder stickstället inte efteråt, men om det börjar kännas fuktigt, ska du öppna förbanden och trycka hårt på det blödande stället tills blödningen upphör.

Under undersökningsdagen bör du undvika att lyfta tungt.

Provbitarna skickas till laboratoriet för undersökning och den remitterande läkaren får resultatet om ett par veckor. Du får veta svaret på undersökningen på mottagningstiden som du får av polikliniken.

Vid behov kan du kontakta den egna hälsovårdscentralen. Vardagar klo 9.00–15.00 kan du också kontakta vår magnetavdelning tel. 040 653 4229 eller 040 653 4223.