

Ultraljudsledd installation av Cystofix

Vi har reserverat tid åt dig för installation av Cystofix på Mellersta Österbottens Centralsjukhus. Anmäl dig på röntgenavdelningens kansli.

____/____ 20____ klo _____.

Om din urinblåsa inte tömmer sig vid urinering eller via urinkateter placerar man en kateter genom huden i nedre buken direkt i urinblåsan. Det här kallas för installation av Cystofix. Åtgärden görs med hjälp av ultraljud.

Förberedelser inför ingreppet

Ifall ni använder blodförtunnande medicin, t.ex. Marevan®, Plavix®, Fragmin®, kontakta enheten (polikliniken/bäddavdelningen) som beställt åtgärden så fort som möjligt om det inte är överenskommet att ni håller paus med medicinerna. Tag också kontakt om du är överkänslig för bedövningsmedel.

Enheten (polikliniken/bäddavdelningen) ordnar ett blodprov för att bestämma blödningstendensen.

Om du har en urinkateter skall den stängas 2-3 timmar före ingreppet.

Åtgärden

Röntgenskötaren förbereder dig inför åtgärden och assisterar röntgenläkaren. Röntgenläkaren utför ingreppet och ger ett utlåtande.

Röntgenläkaren undersöker urinblåsan med ultraljud. Ultraljudsundersökningen med ingrepp tar ca. 20-30 minuter. Röntgenskötaren rengör och täcker undersökningsområdet med sterila dukar. Läkaren bedövar huden och gör ett litet snitt, genom vilket sätts en kateter genom bukskikten till urinblåsan. Vanligen fästs katetern med en ballong inne i urinblåsan och tejpas fast i huden. Ibland fastsätts katetern genom att sy fast i huden och med tejp. Katetern kopplas till en uppsamlingspåse.

Att observera efter ingreppet

Uppföljningen efter ingreppet sker på remitterande avdelning.

Ifall du får gå hem efter ingreppet får du inte vara ensam hemma på 24 timmar.

Kontaktuppgifter

Om den reserverade tiden inte passar dig, eller om du har frågor angående undersökningen, ber vi dig kontakta röntgenavdelningen mellan klockan 8.00 och 15.30. Tel. 040 653 4223