

BEHANDLING AV SEROM EFTER BRÖSTOPERATION

Efter en bröstoperation uppstår vanligtvis en hålighet under huden, dit utsöndras ofta serös eller blodblandad vätska från operationsområdet. Det här händer oftast när hela bröstet opererats bort, men ibland också hos patienter som fått en del av bröstet bortopererat. Vätskeansamlingen, dvs. seroman kan också bildas i armhålan.

Sårdränen sitter kvar på operationsområdet så länge som det bildas över 50ml vätska /dygn, men dränen tas bort senast efter 5 dygn. Om det bildas svullnad på operationsområdet efter att sårdränen borttagits är det ett tecken på att ett serom uppstår.

Vätskeansamlingen ska punkteras varje vecka tills vätskemängden lämnar under 50ml. Det finns ingen medicin eller fysioterapi som kan hindra vätskan från att samlas till ett serom. Antibiotikabehandling påbörjas ifall huden kring operationsområdet rodnar eller känns varmare, eller ifall sekretet som punkteras är grymligt eller varaktigt. Blodprov kontrolleras bara vid misstanke om infektion.

Patienten ska själv boka tid till hälsocentral eller arbetshälsovården för punktion av seroman. Det är viktigt att seroman punkteras regelbundet så att sår läkningen fortskrider normalt.

Punktionen görs direkt på svullnaden under operationssåret eller i armhålan. Patienten sitter under ingreppet, punktionsområdet desinfekteras. Vätskemängden som punkteras kan vara stor, därför rekommenderas att man använder en 60ml spruta, en ljusröd nål och en trevägs infusionskran.

Ifall sårområdet är svullet, men inget sekret fås ut via punktionen, ska man be radiologen göra en ultraljudsundersökning i området.

Om seroma bildas under flera månaders tid är det skäl att konsultera kirurgiska polikliniken 06 826 4293.