

OPERATION AV FÖRTRÄNGNING I HALSPULSÅDERN (CAROTIS-STENOS)

En operation av en förträngd halspulsåder utförs i allmänhet när förträngningen är över 75 % och det orsakar symptom som tex. övergående förlamning, synstörning eller en kortvarig förlust av medvetandet, svimning.

Det uppstår sällan komplikationer vid operationen. Ibland förekommer det blödning på det opererade området, som kan orsaka blåmärken eller hematom på halsen. Blåmärket försvinner av sig själv. Om det är fråga om en stor blödning, fordrar detta en ny operation och ett avlägsnande av hematomet. Det finns många nerver på operationsområdet och under operationen kan en tänjning av dessa orsaka domningskänsla i huden. Detta försvinner av sig själv inom några månader. Den allvarligaste komplikationen är hjärninfarkt. Det är en sällsynt komplikation (risken 3-5%), men patienten bör känna till det här före operationen.

Syftet med en operation är att förhindra hjärninfarkt hos patienter som har större risk att insjukna i detta än vad infarktrisken i samband med operationen är. Operationen är förebyggande. Efter operationen försvinner de övergående symptom som tidigare yppat sig, men operationen tar inte bort skador som uppstått av hjärninfarkt tex. permanent förlamning.

Åtgärd

Operationen görs under nersövning. Såret på halsen görs lodrätt i riktning med halspulsådern. Den nu blottade halspulsådern sluts med en tång på båda sidorna om förträngningen. Medan ådern är avstängd sköter tre andra ådror om blodcirkulationen till hjärnan. Den förträngda ådern öppnas nu och förträngningen skalas bort innifrån ådern. Ådern sys ihop och blodet kan igen passera normalt. Operationen tar i allmänhet ca. 2 timmar.

Sårvård

Såret skyddas av en sårteip som tas bort 2-3 dygn efter operationen.

Såret får duschas 2-3 dygn efter operationen.

Stygnen tas bort i allmänhet 10 dygn efter operationen på närmaste hälsovårdscentral eller på rådgivningen.

Bastubad tillåts när stygnen är borta.

Tillfrisknande

I allmänhet repar man sig snabbt efter operationen. Du blir utskriven 2-3 dagar efter operationen.

Operationsområdet får inte ansträngas på 2 veckor efter operationen.

Sjukledighet

[Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveystalvelukuntayhtymä](#) | [Mellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun](#)

Sjukledigheten är i allmänhet 3-4 veckor efter operationen. Om det är fråga om en färsk hjärninfarkt bestäms sjukledigheten enligt återhämtning från den.

Uppföljning

Operationsresultatet kontrolleras en gång på kirurgiska polikliniken 6 månader efter operationen. Då kontrolleras halspulsåderna med en ultraljudsundersökning.

Ifall det uppstår problem med tillfrisknandet eller med sår läkningen, ta kontakt med den egna hälsocentralen, arbetshälsovården, operationsavdelningen (06) 826 4637, kirurgiska avdelningen 7 (06) 826 4310, kirurgiska avdelningen 10 (06) 826 4310 eller med samjouren 116 117.