

Operationsavdelningen (06) 8264 637

ENDOSKOPI AV LIVMODERN

Vid hysteroskopi undersöks livmoderhålan, för att konstatera orsak till blödningar, t.ex. polyp (godartad förändring i livmoderns slemhinna) eller myom (godartad förändring i livmoderns muskel).

Åtgärd

Åtgärden görs i narkos eller spinalbedövning på operationsavdelningen. Läkaren undersöker livmoderhålan med endoskop. Provbitar kan tas och polyper och myom kan också avlägsnas under ingreppet.

Undersökningen görs under menscykelns början, när blödningen är över.

Fortsattvård

Efter ingreppet kan det förekomma menstruationsliknande smärtor i buken, smärtmedicin kan tas vid behov.

Blödningen efter ingreppet kan förekomma 5-10 dygn. Under blödningen bör samlag, användning av tampong, simning och karbad undvikas på grund av infektionsrisk.

Sjukledigheten är 1-5 dygn, beroende av operationen. Under sjukledigheten bör man vila och undvika fysisk ansträngning.

Efterkontroll sker på gynekologiska polikliniken eller vid hälsocentralen.

Ifall blödningen blir rikligare, det uppkommer smärtor i buken eller febern stiger, ta kontakt till gynekologiska polikliniken tel. (06) 826 4350 eller samjouren 116 117.