

Gastroskopi

Vid gastroskopi, dvs. endoskopisk undersökning av magsäcken, undersöker man matstrupen, magsäcken och övre delen av tolvfingertarmen med ett böjligt rör som är lika tjockt som ett lillfinger. Undersökningen är smärtfri. Endoskopet hindrar inte andning, men det kan kännas svårare att andas under undersökningen än vanligt. Undersökningen kan också orsaka slemavsöndring och aktivera kräkreflexen. Svalget bedövas med en sprej om du inte är allergisk mot bedövningsmedel. På ett första besök tar man vanligtvis små provbitar, men också detta är smärtfritt. Undersökningen tar vanligtvis 5-15 minuter.

Om du vill ha lugnande premedicinering, bör du komma till polikliniken en timme före undersökningen. Om du får premedicinering får du inte köra bil under undersökningsdagen, och du ska ha en följeslagare med dig när du åker hem. Du behöver inte ringa till polikliniken om ditt önskemål om premedicinering på förhand.

Att observera före undersökningen:

- Du ska fasta i 6 timmar och låta bli att dricka i 2 timmar före undersökningen.
- **Diabetesmediciner** ska inte tas före en endoskopisk undersökning. Ta dina diabetesmediciner med dig. Du kan ta dem efter undersökningen. Vid behov kan du ta med dig din egen blodsockermätare.
- På undersökningsdagens morgon är det förbjudet att ta följande mediciner: **Pradaxa, Eliquis, Lixiana, Xarelto och Marevan.**
- **Fragmin, Innohep, Klexane, Arixtra och Orgaran** får inte heller injiceras på morgonen.
- Om du använder **Marevan**, mäts INR-värdet på undersökningsdagens morgon.
- Andra mediciner som ordinerats dig kan du ta minst två timmar före endoskopin med en liten mängd vatten.

Efter undersökningen:

- Om ditt svalg bedövades, får du dricka och äta normalt ungefär en halv timme efter undersökningen, om du inte får andra anvisningar.
- Läkaren kontrollerar provbitsresultaten och skickar vid behov ett brev om dem till dig. Texterna om poliklinikbesök samt undersökningsresultaten kan läsas på Mina kanta-sidorna inom några veckor. (www.kanta.fi/sv/)