

Gummibandsbehandling av åderbräck (varicer) i matstrupen

I samband med en endoskopisk undersökning av din magsäck utfördes det en gummibandsbehandling av åderbräck, dvs. varicer i matstrupen. Det har fästs en hårt åtdragen gummilänk vid basen av venerna i matstrupen. På så sätt förhindras blodcirkulationen i åderbräcket och det lossnar om ungefär tio dagar. Vid behov kan ingreppet göras på nytt.

Åderbräcken utvecklas när leverns normala blodcirkulation har blivit långsammare. Åderbräcken innebär en risk för bristning och livsfarlig blödning. Genom gummibandsbehandling sänks blodtrycket i portådern och på så sätt minskar blödningsrisken.

Begränsningar

MÅLTIDER	De två första dagarna efter ingreppet kan du äta sopprätter. Det är förbjudet att äta grov mat de två första dagarna eftersom gummibanden kan lossna.
MEDICINERING	Efter gummibandsbehandlingen kan det i några dagar förekomma en åtstramande känsla, smärta eller svårigheter att svälja. Om du har smärtor kan du använda någon smärtlindrande medicin som lämpar sig för dig.
ATT RÖRA SIG	Om du fått lugnande och/eller smärtlindrande medicin i samband med ingreppet följer man med ditt tillstånd på polikliniken i ungefär en timme och du får åka hem med en följeslagare.
ATT FÄRDAS	Lugnande och/eller smärtlindrande medicinering gör att du inte får köra bil på ingreppsdagen.
LEVNADSSÄTTET	När du kommit hem kan du fortsätta leva som normal, men beakta de begränsningar du informerats om ovan.

HEMVÅRDSANVISNINGAR

Om du har svaghetskänsla, stark smärta i bröst- eller magregionen, blodiga uppkastningar eller feber ska du kontakta jourpolikliniken på numret 116 117.

ANNAT SOM BÖR BEAKTAS

I oklara situationer kan du lämna en begäran om att uppringd hos skopicientrets sjukskötare, tfn 06 826 4281.