

HEMVÅRDSFÖRESKRIFTER FÖR KRANSARTÄRERNAS KONTRAST- MEDELSUNDERSÖKNING OCH/ELLER BALLONGUTVIDGNING

Efter kontrastmedelsundersökning och/eller ballongutvidgning av kransartärerna är artärväggen vid stickområdet svag. Det läks vanligen inom en vecka och därefter föreligger inga begränsningar till normala dagliga sysslor. För att garantera tillfrisknandet ber vi Er följa följande föreskrifter:

Undvik i två dagar:

- tunga kroppsliga påfrestningar, långa promenader och bastubadande
- förbandet på såret får avlägsnas ett dygn efter ingreppet
- om ingreppet gjorts i ljumskveckets artär skall Ni i några dagar trycka på sticksåret med handen t.ex. om Ni hostar
- sjukledigheten varar 2-3 dygn beroende på yrke

Medicinering

Följ medicinrekommendationerna som Ni får från sjukhuset.

Om Ni genomgått ballongutvidgning **och** man då installerat en stent i kransartären, har man på sjukhuset påbörjat Plavix-medicinering för att förhindra uppkomsten av koagel i stentområdet. Plavix-medicinering används vanligen tillsammans med acetylsalicylsyremedicinering (bl.a. Asperin, Disperin, Primaspan). Koaguleringsrisken är störst under de närmaste veckorna efter ingreppet. Därför är det viktigt, att Ni tar Plavix-medicinen 1 tbl om dagen enligt läkarens ordination.

Om Ni har diabetes och använder följande mediciner skall Ni inte ta medicinerna två dygn före och efter ingreppet:

Diformin, Diformin retard, Metforem, Glucophage, Oramet eller Avandamet.

Om sticksåret blöder eller sväller

- tryck genast på såret
- gå omedelbart till närmsta hälsocentral eller sjukhus
- fortsätt att trycka på sticksåret tills vårdpersonalen har granskat det

Tag kontakt

om sticksåret ömmar, om Ni märker förändringar i benets funktionsförmåga eller om bröstsmärtorna blir värre eller återkommer

till Hjärtundersökningsenheten må-ti tel. (06) 826 4920 eller
till dejourhjälp (övriga tider) tel. 116117