

Igångsättning med ballongmetoden

Man har beslutat att sätta igång din förlossning med ballongmetoden. Ballongkatetern utvidgar livmodermunnen mekaniskt och gör samtidigt så att prostaglandinhormon börjar utsöndras från fosterhinnorna. Det här leder till att livmodermunnen mjuknar, öppnas och förkortas. Vanligtvis fortsätter igångsättningen, efter att katetern kommit bort spontant eller avlägsnats, med att man tar håll på fosterhinnorna och vid behov påbörjar oksitosindropp. Katetern kan också göra så att värkarna kommer igång.


Ballongkatetern är en vanlig urinkateter, som läkaren för in genom livmodermunnen i samband med en inre undersökning. Ballongen, som finns i kateterns övre del, hamnar på insidan av livmodermunnen. När katetern är på plats fylls ballongen med 40-60ml sterilt vatten eller koksalt. Katetern tejpas fast på insidan av låret. Efter att katetern satts in kan du röra dig fritt och gå på wc och i duschen som vanligt. Följ med fosterrörelserna på samma sätt som hittills.

Efter att ballongkatetern satts in, kan du ha lite blödning och stramande känsla i nedre buken. Om du är grundfrisk och din graviditet förlöpt normalt, kan du gå hem med katetern. Vi bokar in en tid åt dig till förlossningsavdelningen följande morgon. Där tas katetern bort, om den ännu är på plats. Efter det gör läkaren en inre undersökning och beslutar, på basen av livmodermunnens mognad, om du förflyttas till förlossningsalen eller om du kommer in på avdelningen för att få värkstimulerande prostaglandintabletter.

Ballongkatetern kommer ofta bort av sig själv, ibland redan efter några timmar. Du kan i så fall ta avlägsna tejpens och ballongen och kasta den i vanlig skräpkorg. Om katetern kommer bort innan kl 16 kan du ringa till förlossningsavdelningen tel 06 826 4355 och höra om det är möjligt att komma för en bedömning redan samma dag. Om katetern kommer bort efter kl 16, kan du i lugn och ro vänta hemma till följande morgon.

Ring till avdelning 3 om:

- du inte känner normala fosterrörelser
- du får riklig blödning
- tilltagande buksmärta
- feber
- om du misstänker barnvattenavgång
- du får regelbundna sammandragningar
- ballongkatetern kommer bort innan kl 16



Om katetern kommer bort efter kl 16 eller ännu är på plats, ska du komma till avdelning 3: ____/____ klo: ____.