


KLYVNING AV PROSTATAN DVS. TUIP



Operation och återhämtning

När urinrörets mynning är förträngd, kan detta åtgärdas genom att göra ett snitt i urinblåsans hals via urinröret. Samtidigt klyvs även prostatan som omger urinrörets mynning. Ingreppet görs på operationsavdelningen under ryggbedövning.

I samband med ingreppet sätts in en kateter som ska vara kvar i 1-2 dagar. Ni kan åka hem efter att katetern tagits bort, när urineringen sker normalt och urinblåsan töms tillräckligt bra. Efter att katetern tagits bort kan det förekomma tätare urineringsbehov, sveda samt urininkontinens i samband med hostande eller ansträngning. Vanligtvis försvinner symptomen av sig själv inom två månader.

Ibland händer det att urineringen inte kommer i gång eller att urinblåsan inte töms ordentligt efter att katetern tagits bort. Då sätts urinkatetern tillbaka och ni får åka hem med katetern. Katetern tas bort efter ungefär en vecka på hälsovårdscentralen eller på kirurgiska polikliniken.

Blod i urinen

I början kan det finnas blod i urinen. Rikligt drickande främjar urinutsöndringen och förhindrar möjliga blodkoagel att samlas i urinblåsan. Om det finns blod i urinen är det bra att dricka cirka 1½ - 2 liter vätska per dag. Ta dock i beaktande vätskebegränsningar p.g.a. möjliga andra sjukdomar.

Även förstoppning kan orsaka blod i urinen. Förebygg förstoppning med fiberrik mat, genom att dricka tillräckligt samt vid behov genom att använda preparat som främjar tarmfunktionerna.

Blod i urinen är inte farligt och slutar vanligtvis av sig själv. Om det inte kommer urin, urinen blir helt blodig eller ni får hög feber före efterkontrollen, kontakta då i första hand den egna hälsocentralen eller samjouren.

Smärta

Smärtan kan vara sveda eller kände av tryck i ingreppsområdet. Då kan ni vid behov