

Ihminen keskiössä

Individen i centrum

Hoidonvaraaja, puh. 06-826 4782 (ma-pe klo. 9-11)

Osasto 10, puh. 06-826 4310

KIVESTEN POISTOLEIKKAUS ELI ORKIEKTOMIA

Kivesten poistoleikkaus tehdään yleensä joko kivessyövän vuoksi tai eturauhassyövän vuoksi. Kivessyövän hoitona on yleensä kiveksen poisto, lisäksi käytetään säde- ja solunsalpaajahoidoa sekä imusolmukkeiden poistoa tarpeen mukaan. Mikäli kivekset poistetaan osana eturauhassyövän hoitoa, poiston tarkoituksena on lopettaa mieshormonien vaikutus sekä pysäyttää tai hidastaa taudin etenemistä.

Leikkaus

Leikkauksessa poistetaan joko toinen tai molemmat kivekset. Toimenpide tehdään selkäydinpuudutuksessa. Leikkauksen yhteydessä voidaan asettaa silikoinen kivesproteesi, joka muistuttaa oikeaa kivistä. Lääkäri keskustelee kanssasi kivesproteesin asettamisesta ennen leikkausta. Leikkauksen jälkeen voitiasi tarkkaillaan heräämössä parin tunnin ajan, jonka jälkeen siirryt vuodeosastolle.

Hormonitoiminnan muutokset

Kivesten poiston suotuisa vaikutus eturauhassyöpään alkaa muutamassa päivässä. Joillekin saattaa toimenpiteen jälkeen ilmaantua kiusallista kohtauksittaista hikoilua eli "kuumia aaltoja", jotka vähenevät vähitellen vuoden kuluessa. Kun hormonitoiminta loppuu, häviää myös useimmilta halu ja kyky yhdyntään. Molempien kivesten poiston jälkeen miesten testosteronin lasku voi aiheuttaa myös osteoporoosia.

Seksuaalisuus

Seksuaalisuudessa tapahtuviin muutoksiin sopeutuminen vaatii aikaa ja voimavaroja. Jos omat voimat eivät riitä, puhu puolison tai läheisen kanssa. Voit aina kääntyä hoitavan lääkärin ja hoitajan puoleen kaikissa syöpään liittyvissä asioissa. Heidän kauttaan saat myös tarvittaessa yhteyttä muihin asiantuntijoihin.

Haavan hoito

Kivespussissa on haava, josta ompeleet sulavat pois 7-14 päivän kuluessa. Pidä haava puhtaana suorittamalla alapesu päivittäin pelkällä vedellä sekä vaihtamalla pesun jälkeen puhtaat alushousut. Saunaan voit mennä, kun ompeleet haavalta ovat sulaneet. Jos haavalla on kotiin lähtiessä haavateippi, anna sen olla siinä muutaman päivän ajan.

Kotiin pääsyn jälkeen leikkaushaavan sekä mahdollisen kivesproteesin tarkkailu on tärkeää. Jos kiveshaava erittää verta tai märkää, poista mahdollinen haavateippi ja suihkuta haavaa ainakin 2-3 kertaa päivässä esimerkiksi alapesusuihkulla tai pese lämpimällä vedellä. Laita haavan päälle sidetaitos tai vaikka terveyside. Jos erityisesti haavalta jatkuu tai haavan paranemisessa on ongelmia, ota yhteys lähimpään terveyskeskukseen tai osastolle 10, puhelin 06 826 4310.

[Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveystalvvelukuntayhtymä | Mellersta Österbottens social- och hälsövärdssamkommun](#)

Ihminen keskiössä

Individen i centrum

Hoidonvaraaja, puh. 06-826 4782 (ma-pe klo. 9-11)

Osasto 10, puh. 06-826 4310

Kontrolli

Jälkitarkastus on urologian poliklinikalla. Jälkitarkastusajan ja sitä edeltävien laboratoriotutkimusten ajat ja ohjeet saat kotiutuessasi.