

Konisering av livmodertappen

Indikationer

Du har tidigare genomgått en mikroskopiundersökning (kolposkopi). I provbitarna som då togs konstaterades cellförändringar som man nu vill avlägsna genom konisering

Ingreppet

Konisering görs i huvudsak i lokalbedövning på polikliniken för kvinnosjukdomar. I undantagsfall görs ingreppet på operationavdelningen i narkos eller spinalbedövning.

Vid konisering avlägsnas en bit av livmodertappen. Den borttagna biten undersöks av patologen som fastställer vilken typ av cellförändring det är fråga om och om förändringen har avlägsnats i sin helhet. Vanligtvis görs en ny kolposkopiundersökning 6 månader efter koniseringen.

Efter ingreppet

Vanligtvis behövs ingen sjukledighet. Vid behov skriver vi ett intyg över besöket. Undvik kraftig ansträngning ett par dagar efter ingreppet. Det är normalt med blodig flytning under ett par veckors tid. Använd inte tamponger, ha inte samlag och bada eller simma inte så länge du har efterblödning. Lindriga smärtor i nedre buken kan förekomma.

När bör man ta kontakt?

Om du får feber, illaluktande flytning och kraftigare buksmärter kan det vara tecken på infektion. Kontakta i sånt fall kvinnopolikliniken eller den egna hälsocentralen. Det samma gäller om blödningen plötsligt blir rikligt efter att redan avtagit.