

MEDICINER SOM BÖR AVSLUTAS FÖRE OPERATION

Mediciner som hämmar blodets naturliga benägenhet att levera sig t.ex.

Marevan®, **Marcoumar®**, **Plavix®**, **Pradaxa®**, **Clopidogrel®**, **Tiklyd®**, **Efient®**, **Briligue®**, **Xarelto®**, **Arixtra®**, **Klexane®**, **Fragmin®**, **Innohep®**, **Eliquis®**, **Lixiana®**

Kontakta tidsbeställningen om du använder ifrågavarande mediciner.

Om du har fått tid till förbesök på sjukhuset får du där råd om vilka mediciner som bör pausas. Ifall du använder **Omega 3** kapslar, bör användningen avslutas **1 vecka** före ingreppet.

Reumamediciner

Reumamediciner pausas enligt anvisningar av reumaläkare. Anvisningarna skickas i samband med kallelsebrevet. I oklara fall kan du kontakta enheten som sköter om din reuma sjukdom.

Mediciner som används inom cancervården

Avastin®, **Stivarga®**, **Zaltrap®** pausas **4 veckor** innan operationen.

Tamofen® pausas **2 veckor** innan ingreppet.

Glivec®, **Inlyta** pausas minst **2 veckor** innan ingreppet.

Sutent®, **Nexavar®**, **Votrient®**, **Afinitor®**, **Tarceva®**, **Iressa®**, **Zelboraf®**, **Taniflar®**, **Giotrif®**, **Xalkori®**, **Tyverb** pausas minst **1 vecka** innan operationen (om dina blodvärden påvisar avvikelser kan medicinen vid behov pausas tidigare).

Om du får sytostat- och/eller annan behandling bör du kontakta Cancerpolikliniken för noggrannare råd.

Vid frågor, kontakta tidbeställningen, **telefontider vardagar kl. 9-10:**

06 826 4777 må – fre (tand- och käkkirurgi, gynekologi, pediatrikkirurgi, plastikkirurgi, proteskirurgi)

06 826 4782 må – fre (gastrokirurgi, urologi)

06 826 4774 må – fre (blodkärlskirurgi, öron-, näs- och svalgssjukdomar, gastro- och colonoskopier)

06 826 4788 må - fre (ortopedi, handkirurgi)