

Operationsavdelningen (06) 8264 637

NOVASURE

Åtgärd

Med Novasure radioenergi avlägsnas livmoder slemhinnan (endometrium). Ingreppet minskar menstruationsblödning eller blödningen upphör. Det är också möjligt att menstruations smärtor försvinner. Novasure ingreppet kan göras åt kvinnor med riklig menstruationsblödning, som inte mera tänker skaffa barn.

Novasure behandling gös i narkos eller i lokalbedövning.

Smärtvård

Efter behandlingen förekommer menstruations liknande smärtor i några dagar. Under behandlingsdagen kan smärtor förekomma. Det är viktigt att använda värkmedicin regelbundet under några dagar, för att hålla smärtor under kontroll.

Fortsatt vård

Efter ingreppet förekommer blödning under 2-6 veckor. Blödningen är rikligast under 10-14 dagen efter ingreppet. Det är viktigt med nedre dels tvätt morgon och kväll, samt efter WC-besök under tiden för blödning. Samlag och användning av tampong, samt simning och karbad bör undvikas under blödningstiden.

Efter ingreppet minskar menstruationsblödningen eller slutar helt. Vanligen normaliseras blödningen efter 3-5 månader. Behandlingens avsikt är att avlägsna livmoder slemhinnan, det är ändå möjligt att bli gravid och preventivmedel bör användas.

Efterkontroll behövs inte, men telefontid ges till gynekologiska polikliniken inom 3 månader. Sjukledigheten är 1-2 dagar.

Problem

Ifall blödningen är illaluktande, du har feber eller smärtor i buken, ta kontakt till: gynekologiska polikliniken kl. 8.30–15.30 06- 826 4350 eller samjouren 116 117.