

OPERATION AV HYDROCELE (VATTENBRÅCK)

Med vattenbråck avses ett bråck i pungen innehållande vätska. Orsaken till vattenbråcket är oklart, det kan vara fråga om skada, infektion, växt eller förvriden testikel.

Symtom på vattenbråck kan vara endast en förstoring av pungen. Smärta och tyngdkänsla kan förekomma. Diagnostiseringen sker via undersökning, genomlysning samt ultraljudundersökning. Vattenbråcket opereras endast ifall det ger symtom.

Operation

Ingreppet görs i ryggbedövning och förändringen i pungen avlägsnas.

Smärtvård

Smärta kan förekomma ett par dagar, man kan använda **inflammations hämmande värkmedicin** eller den värkmedicin du brukar använda.

Sårvård

Stygnen är resorberbara, de behöver inte avlägsnas. Såret får **duschas från följande dag, morgon och kväll, samt alltid efter toalettbesök**, med ljumt vatten under en vecka. Torka operationsområdet försiktigt. **Bastu** är tillåtet efter en vecka. Stadiga underbyxor rekommenderas att använda under 1 vecka.

Fortsatt vård

Man bör vila operationsdagen, nästa dag kan man röra sig så mycket som smärtan tillåter. Undvik idrott och fysisk ansträngning under 3 veckor. Samlag är tillåtet, när såret läkts, efter ca 2 veckor.

Sjukledighet behövs 2-3 veckor, beroende på arbetet.

Efter operationen förekommer vanligtvis svullnad och blåmärken i pungen. Det kan förekomma vätskning från sår området någon dag.

Ifall det uppstår problem med tillfrisknandet eller sår läkningen ta kontakt med hälsocentralen, arbetshälsovården, kirurgiska avdelningen 10 (06) 826 4310, kirurgiska avdelningen 7 (06) 826 4303, kirurgiska polikliniken (06) 826 4293, operationsavdelningen tel. (06) 826 4637 eller samjouren tel. 116 117.