

## OPERATION AV ICKE NEDSTIGEN TESTIKEL

Testikeln utvecklas under fosterstadiet i bukhålan nära njurarna. I slutet av graviditeten sjunker testikeln ner till sin normala plats. Det händer delvis sjunkning ännu efter födseln. Ifall testiklarna inte sjunker naturligt till pungen, kan produktionen av hormoner och spermier inte utvecklas normalt.

### Operation

Ingreppet görs i **narkos**. Sadesledaren frigörs från sammanväxningar, så att den når ner i pungen. Vid operationen görs ett tre till fyra centimeter långt sår i ljumsken och ett lite mindre sår i testikeln.

### Smärtvård

I slutet av operationen bedövas sårområdet för att minska smärtan efter ingreppet. Sår smärta förekommer någon dag. Barnet bör **regelbundet få värkmedicin** under de två första dagarna efter operationen.

### Sårvård

Såret sluts med resorberbar tråd. Såret skyddas med plastfilm, som avlägsnas efter fem dagar.

Barnet kan duscha efter ett dygn och bada bastu efter en vecka. Använd lösa kläder och byt blöjan tillräckligt ofta för att undvika irritation av sår området.

Efter operationen kan det under några dagar förekomma, svullnad och blåmärken, speciellt i pungen.

### Fortsatt vård

Under operationsdagen behöver barnet vila och uppsikt av en vuxen. Barnet får röra sig normalt, som smärtan tillåter. Till dagvård eller skola kan barnet gå inom 1-3 dagar.

Ifall det uppstår problem, ta kontakt med operationsavdelningen tel. 06 826 4637, närmaste rådgivning eller barnjouren tel. 06 826 4444.