

OPERATION AV KNÖL I BRÖSTET

Åtgärd

Operation av knöl i bröstet görs vanligtvis i lokalbedövning, ifall knölen är stor görs ingreppet i narkos. Ibland görs ingreppet via ultraljudsundersökning eller med trådmarkeringsbestämning av knölen.

Smärtvård

Smärta kan förekomma i operationsområdet några dagar. Tag den värkmedicin du brukar använda.

Sårvård

Sår kompresserna kan avlägsnas följande dag. Sårdynan avlägsnas efter två dagar och du kan duscha. Stygnen avlägsnas vid rådgivningen, arbetshälsovården eller egna hälsocentralen. Du kan bada bastu följande dag efter stygnborttagningen. Ifall såret sluts med resorberbar tråd behöver stygnen inte tas bort.

I bröstet finns rikligt med små blodkärl som blöder lätt efter ingreppet. Därför är det viktigt att operationsområdet stöds ordentligt. Använd rena kompresser i brösthållaren som stöd, tills stygnen tas bort.

Fortsatt vård

Du kan röra dig normalt efter operationen, sår området bör aktas tills stygnen tas bort.

Sjukledigheten ges beroende på sina arbetsuppgifter, från någon dag, till 2 veckor.

Om det tas provbit, meddelas svaret inom 3-4 veckor. Ifall meddelande inte kommit inom 4 veckor, ta kontakt med operationsavdelningen.

Ifall det uppstår problem med tillfrisknandet eller med sår läkningen, ta kontakt med den egna hälsocentralen, arbetshälsovården, operationsavdelningen (06) 826 4637, kirurgiska avdelningen 7 (06) 826 4310, kirurgiska avdelningen 10 (06) 826 4310 eller med samjouren 116 117.