

## OPERATION AV LJUMSKBRÅCK

Ljumsnbråck hos barn orsakas av störning i utvecklingen under fosterstadiet, symtom kan uppstå först efter något år. Bråcket är en utbuktning av bukhinnan i ljumskan.

### Operation

Operationen görs i narkos, utbuktningen av bukhinnan som bildat bråck påsen avlägsnas.

### Smärtvård

Operationsområdet bedövas med **långverkande bedövningsmedel** för att minska smärtan efter operationen. **Ge ert barn värkmedicin regelbundet det två första dagarna.**

### Sårvård

Efter operationen kan det förekomma svullnad och blånad. Såret sluts med resorberbar tråd. Den genomskinliga såretejpen får avlägsnas efter 5 dygn. Barnet får duscha dagen efter operationen, karbad och bastu är tillåtet efter en vecka.

### Fortsatt vård

Bedövningsmedlet i operationsområdet kan tillfälligt orsaka kraftlöshet i opererade sidans ben. Under operationsdagen behöver barnet vila och vara under uppsikt av en vuxen. Barnet får röra sig normalt, såsom smärtan tillåter. Till dagvård eller skola kan barnet gå efter ett par dagar, men skolgymnastik rekommenderas först efter en vecka.

Ifall det uppstår problem, ta kontakt med operationsavdelningen tel. 06 826 4637, närmaste rådgivning eller barnjouren tel. 06 826 4444.