

## OPERATION AV NAVELBRÅCK

Med bråck avses hål eller försvagning i bukväggen, en del av tarmen eller bukhinnan trycks in i bråckpåsen. Navelbråck uppkommer runt naveln.

### Operation

Operationen görs i narkos, utbuktningen av bukhinnan som bildat bråck påsen avlägsnas och bukhinnan sys med stadiga stygn.

### Smärtvård

Operationsområdet bedövas med **långverkande bedövningsmedel** för att minska smärtan efter operationen. **Ge ert barn värkmedicin regelbundet det två första dagarna.**

### Sårvård

Efter operationen kan det förekomma svullnad och blåmärken. Såret sluts med resorberbar tråd. Sårtejpen får borttas 5 dagar efter operationen. Barnet får duscha dagen efter operationen, karbad och bastu är tillåtet efter en vecka.

### Fortsatt vård

Under operationsdagen behöver barnet vila och vara under uppsikt av en vuxen person. Barnet får röra sig normalt, som smärtan tillåter. Till dagvård eller skola kan barnet gå efter ett par dagar, men skolgymnastik rekommenderas först efter 2 veckor.

Ifall det uppstår problem, ta kontakt med operationsavdelningen tel. 06 826 4637, närmaste rådgivning eller barnjouren tel. 06 826 4444.