

## OPERATION AV TRÅNG FÖRHUD

### Val av behandlingsmetod

Alltid, då det är möjligt görs ett utvidgande ingrepp så att förhuden sparas. I lindrigaste fall kan frigöring av sammanväxningar vara tillräckligt.

### Operation

Ingreppet görs i **narkos**. Vid **frigöring av sammanväxningar** lösgörs förhuden för att kunna föras normalt bakåt. Sparande ingrepp av förhuden är också plastik av förhuden vilken betyder att man gör 1-3 frigörande snitt vilka sys med resorberbar tråd.

Vid **omskärelse (circumcisio)**, som görs endast om förhuden är helt förärrad och orsakar infektion och urineringsbesvär, avlägsnas den förträngda förhuden helt.

### Smärtvård

Sårsmärta kan förekomma i några dagar. Barnet bör **regelbundet få värkmedicin** under de två första dagarna efter operationen.

### Sårvård

Vid ingreppet användes **resorberbar tråd**, som inte behöver avlägsnas. Stygnen smälter inom 1-2 veckor.

Vid omskärelse skyddas såret vid behov med silikon-kompress, som lossnar av sig själv eller kan tas bort hemma samma kväll som ingreppet utförts.

**Duscha** operationsområdet med ljummet vatten en gång dagligen samt alltid efter toalettbesök och ifall urineringen känns smärtsam. Efter duschen används vitvaselin på operationsområdet, om sparande ingrepp gjorts, tills värsta svullnaden har minskat. Bastu är tillåtet efter en vecka.

Använd **löst sittande kläder**, för att förhindra irritation av operationsområdet.

Efter operationen kan det under några dagar förekomma, svullnad, mindre blödningar och utsöndring av sårsekret, allt detta hör till normal sårhäkning.

### Fortsatt vård

Under operationsdagen behöver barnet vila och uppsikt av en vuxen. Barnet får röra sig normalt, enligt hur smärtan tillåter. Till dagvård eller skola kan barnet gå inom några dagar, men skolgymnastik rekommenderas först efter en vecka.



Ihminen keskiössä  
Individen i centrum

Ifall det uppstår problem, ta kontakt med operationsavdelningen tel. 06 826 4637, närmaste rådgivning eller barnjouren tel. 06 826 4444.