

Päiväys 28.1.2022
Versio 2
Laatija Iiris Dahl
Hyväksyjä Stefan Anderson

PD-behandling och sexualitet

Njursvikt stör hormonbalansen. Det påverkar tillväxten hos barn och vid puberteten blir utvecklingen försenad. Hos vuxna påverkar det samverkan mellan hypofysen och kön körtlarna

Allmänna symtom på hormonala störningar är störningar i menstruationscykeln och avsaknad av ovulation. Fertiliteten försämras, spermiehalten minskar och rörelseförmågan hos spermier försämras. Libidon påverkas och beroende av det kan avsaknad av sexuell lust samt svårigheter att bli upphetsad och våt förekomma. Njursvikt påverkar också blodomloppet. Symtom som orsakas av försämrat blodomlopp är erektionsproblem eller störningar i utlösning, känselbortfall, irritation i slemhinnor och atrofi.

Njursvikt påverkar patientens fysiska och psykiska förmåga. Dialysbehandlingen och medicineringen är tuffa för patienten och kan orsaka trötthet och motvilja, erektionsbesvär samt ändringar i självbild. För vissa kan dialysvätskan i buken störa samlaget. Pd-katetern i sig själv kan kännas som motbjudande av patienten själv eller hos partnern. Det vore bra för partnern att bekanta sig med katetern på förhand, en bekant sak stör inte så mycket och känns inte så skrämmande. Vätskan från buken kan tappas ur helt eller till en viss del före akten. En bra och bekväm position hos båda parter påverkar också och bidrar till en positiv sexuell upplevelse.