

Päiväys 21.1.2022  
Versio 2  
Laatija Katja Heikkiniemi  
Hyväks Stefán Anderson  
yjä

---

## PD-behandlingens olika former:

Peritonealdialysen kan göras på två olika sätt: Manuellt för hand (CAPD) eller automatiskt (APD) med hjälp av en maskin. Ifall patienten är oförmögen att göra byten själv kan man vid behov skola assistenter att göra byten i samverkan med patienten eller för patienten.

**CAPD:** -Byten görs manuellt 4-5 ggr/dygn, vanligen morgon, middagstid, eftermiddag och på kvällen. vätskan är ca 4 timmar i buken åt gången. (nattpåsen ca. 8 timmar). Patienten har med andra ord vätska konstant i buken.

-Före byten bör den valda dialysvätskan värmas upp med en skild värmeplatta. Ifall vätskan är för kall(under kroppstemperatur) får patienten frossa.

-Undantagsvis kan man sakta sätta in vätska som inte är förvärmad ex. på en bilutfärd, men detta rekommenderas inte att göras regelbundet.

Päiväys 21.1.2022  
Versio 2  
Laatija Katja Heikkiniemi  
Hyväksyjä Stefan Anderson



- APD:**
- Dialysen görs med hjälp av en skild APD-apparat nattetid. Patienten är kopplad till apparaten 8-10 timmar om natten, under vilket dialysvätskan byts automatiskt flera gånger via apparaten.
  - APD-behandlingen har olika vårdprogram beroende på hälsotillståndet, peritoneal prövningen och patientens livsstil

Päiväys 21.1.2022  
Versio 2  
Laatija Katja Heikkiniemi  
Hyväksyjä Stefan Anderson

---

