

PATIENTINFORMATION: BEHANDLING AV SEROM (VÄTSKEANSAMLING) EFTER BRÖSTCANCEROPERATION

Efter en bröstcanceroperation ansamlas ofta ljusgul eller blodblandad vätska i operationsområdet. Detta händer ofta när man tagit bort hela bröstet, men kan även förekomma när endast en del av bröstet borttagits. Vätska kan även ansamlas i armhålan.

Vätskan ska tömmas med en nål (punktion) ungefär en gång per vecka tills vätskemängden minskar till under 50 ml/punktion.

Det går inte att förhindra ansamlingen av vätska med läkemedel eller fysioterapi.

Antibiotikabehandling behövs inte ifall huden inte är klart rodnad och varm eller vätskan inte är grumlig eller varliknande. Vad gäller blodprov tas CRP endast om man misstänker infektion. Vid behov kan man ta en bakterieodling av vätskan i samband med punktionen.

Tömning av vätska (punktion)

Tömning av vätska görs av läkare på den egna hälsocentralen eller på arbetshälsovården dit du själv kan ta kontakt.

Att dra ut på tiden för punktionen försämrar sårhäkningsprocessen.

Punktionen ska göras direkt på det utbuktande området under operationsärret eller i armhålan.

Ifall man inte lyckas tömma vätskan, men området är svullet och du upplever besvär från det, så kan läkaren göra en remiss till röntgenläkare för ultraljudsundersökning för att kontrollera ifall vätska förekommer.

Ifall vätskeansamlingen fortgår i flera månader så kan läkaren även konsultera kirurg, ibland kan en ny operation komma på fråga.

När såret har läkt så påbörja användningen av din bröstprotes (när hela bröstet tagits bort). Det är även viktigt att använda brösthållare som stöder bröstet ordentligt.