

PATIENTANVISNING TILL DIG SOM KOMMER PÅ HYSTEROSKOPI

Förberedelse

Ta **Burana 800mg (=2st 400mg tabletter)** och **Panadol 1g (=2st 500mg tabletter)** tas hemma 2 timmar före ingreppet.

Syftet med medicinerna, förutom att de lindrar smärta, är att förhindra sammandragningar i livmodern och på så sätt underlätta ingreppet.

Ingreppet

görs lämpligast genast efter menstruation (inom två veckor). Du kan komma till sjukhuset med egen bil och äta och dricka normalt före.

Ingreppet går till så, att ett tunt instrument förs in genom livmoderhalsen till livmodern. Genom hysteroskopet cirkulerar varm vätska som gör att livmoderhålan utvidgas något och gör det möjligt att undersöka och vid behov åtgärda förändringar som tex polyper, myom. Livmoderhalsen bedövas vid behov beroende på ingreppet och extra värkmedicin ges vid behov.

Efter ingreppet

observeras du på polikliniken enligt behov. Om du mår bra kan du åka hem så gott som genast. Vanligtvis behövs ingen sjukskrivning. Patienterna har vanligtvis bara lindrig smärta efter ingreppet och ytterst sparsam efterblödning.

Välkommen!