

Operationsavdelningen (06) 8264 637

STERILISERING

Åtgärden görs i narkos via endoskop. Två till tre små snitt görs och äggledarna tas bort eller sluts med små klips. Åtgärden räcker ca 30 minuter.

Sårvård

Såret sys med resorberbar tråd, stygnen behöver inte avlägsnas. Efter 1 dygn kan kompresserna tas bort och man kan duscha och bada bastu. Sårtejpen tas bort efter 2 dygn.

En sparsam blödning från underlivet kan förekomma. Tvätta underlivet med ljummet vatten efter varje WC-besök.

Användning av tampong eller samlag ökar infektionsrisken under blödningen.

Smärtvård

Hemma kan man använda receptfri värkmedicin.

Efter laparoskopi kan förutom sår värk förekomma stickningar i axeln och övre buken, symptomen försvinner efter ett par dagar. Man kan röra på sig och ta värkmedicin för besvären.

Efterkontroll behövs inte.

Sjukledigheten är 2-4 dagar. Tungt arbete och motionerande bör undvikas under sjukledigheten.

Ifall det uppkommer feber, svår smärta, riklig blödning eller andra symptom, ta kontakt med gynekologiska polikliniken tel. (06) 8264 350 eller vid jourtid med samjouren tel. 116 117.