

Operationsavdelningen (06) 8264 637

## TANDVÅRD I NARKOS

### Åtgärd

Vid tandvård i narkos, plomberas tänderna och vid behov görs utdragning av tand. Lokalbedövning görs vid utdragning, för att minska smärta och blödning efter ingreppet. Bedövningen räcker ca 1- 4 timmar.

Under ingreppet har \_\_\_\_\_ tänder plomberats och \_\_\_\_\_ tänder har dragits ut.

### Smärtvård

Ge smärtmedicin \_\_\_\_\_

---

### Fortsatt vård

På dagen då ingreppet görs, bör man äta sval och mjuk mat. Följande dag kan man äta normalt.

Det kan kännas annorlunda i munnen efter ingreppet, t.ex. svullnad eller nya plomber. För att minska svullnad, använd ispåse ca 20 minuter åt gången. Skydda påsen med ett tunt tyg.

Barn behöver vila och ha uppsikt av en vuxen person efter ingreppet. Det är viktigt att åka direkt hem från sjukhuset. Följande dag kan barnet gå till dagvård eller skola.

Tänderna kan borstas normalt från följande dag.

Fortsatt vård sker vid den egna hälsocentralen. Ta kontakt till hälsocentralen efter 6 månader.

### Munhygien

Regelbundna måltider är viktigt och xylitol tuggummi eller pastill efter maten förhindrar uppkomst av hål i tänderna. Vatten rekommenderas vid törst. Söta drycker sänker pH-värdet i munnen och förorsakar syra angrepp på tandemaljen som kan orsaka hål i tänderna.

Tänderna bör borstas två gånger dagligen.

Föräldrarna ansvarar för barnens tandborstning tills barnet är 10-12 år.