

Operationsavdelningen (06) 8264 637

UNDERSÖKNING AV TARMEN I NARKOS (TÖMNING HEMMA)

Undersökningen

Vid colonoskopi undersöks ändtarmens och tjocktarmens slemhinna och vid behov tas provbitar.

Tillräcklig tömning av tarmen är en förutsättning för att undersökningen skall lyckas.

Förberedelser hemma

En vecka före undersökningen får ert barn inte äta bär som innehåller frön (t.ex. hallon, hjortron), frukt och grönsaker med hårt skal (t.ex. äppel, tomat) eller linfrö.

Två dagar före undersökningen får barnet inta, endast flytande föda, fil, bärfri yoghurt, köttbuljong eller saftsoppa.

Dagen före undersökningen

Barnet får äta flytande föda till morgonmål.

Till lunch kan barnet äta flytande föda, därefter påbörjas drickandet av Colosteril-lösningen ca kl. 12-14. Lösningen skall intas tills avföringen är klar, vanligtvis ca 3 liter. Lösningen kan drickas kall, sockerfria pastiller underlättar drickandet. Efter tömningen kan barnet dricka små mängder klar saft men inte äta något.

Undersökningdagen får barnet dricka vatten eller klar sockrad saft tills 2 timmar före ankomsttiden.(barnet under 3 år högst 1 dl, över 3 år högst 1,5dl)

Efter undersökningen på operationsavdelningen

Vi följer med barnets välbefinnande i uppvakningsrummet, varifrån han/hon vanligen blir utskriven efter 1-3 timmar efter ingreppet.

Barnet får försiktigt börja dricka efter narkosen då hon/han har vaknat. Om barnet inte börjar må illa av drickandet, kan ni ge honom/henne någon lätt föda t.ex. glass eller yoghurt (fås på enheten).

Om ni kommer till sjukhuset med egen bil och inte använder taxi till hemresan, bör barnet ha två vuxna följeslagare under hemresan.

Barnet måste hela tiden vara under tillsyn av en vuxen person. Barnet får leka om han/hon orkar.

Läkaren kontrollerar svaren av eventuella prov och meddelar svaren per post inom ca 3 veckor, ifall inte annat överrenskommit med läkaren.