

UNDERSÖKNING AV TARMEN I NARKOS (tömning på avdelningen)

Undersökningen

Vid colonoskopi undersöks ändtarmens och tjocktarmens slemhinna och vid behov tas provbitar.

Tillräcklig tömning av tarmen är en förutsättning för att undersökningen skall lyckas.

Förberedelser hemma

En vecka före undersökningen får ert barn inte äta bär som innehåller frön (t.ex. hallon, hjortron), frukt och grönsaker med hårt skal (t.ex. äppel, tomat) eller linfrö.

Två dagar före undersökningen får barnet inta, endast flytande föda, fil, bärfri yoghurt, köttbuljong eller saftsoppa.

Förberedelser på barnavdelningen, dagen före undersökningen

Förrän barnet kommer till barnavdelningen kan flytande morgonmål intas.

Till lunch får barnet flytande kost, efter det påbörjas Colonsteril tömningen cirka kl.12-14. Lösningen intas tills avföringen är helt klar vätska, vanligtvis ca.3 liter.

Lösningen har bättre smak och är lättare att dricka avkyld. Sockerfria pastiller underlättar drickandet.

Barnet får inte äta någonting efter tömningen men får dricka små doser klar saft.

På undersökningsdagen kan barnet dricka vatten eller klar, sockrad saft tills 2 timmar före planerade ingreppet.(barnet under 3 år högst 1dl, över 3 år högst 1,5dl)

Barnets mor eller far kan delta i vården på barnavdelningen och undersöknings dagen på operationsavdelningen.

Efter undersökningen på operationsavdelningen

Vi följer med barnets välbefinnande i uppvakningsrummet, varifrån han/hon vanligen blir utskriven efter 1-3 timmar efter ingreppet.

Barnet får försiktigt börja dricka efter narkosen då hon/han har vaknat. Om barnet inte börjar må illa av drickandet, kan ni ge honom/henne någon lätt föda t.ex. glass eller yoghurt (fås på enheten).

Om ni kommer till sjukhuset med egen bil och inte använder taxi till hemresan, bör barnet ha två vuxna följeslagare under hemresan.

Barnet måste hela tiden vara under tillsyn av en vuxen person. Barnet får leka om han/hon orkar.

Läkaren kontrollerar svaren av eventuella prov och meddelar svaren per post inom ca 3 veckor, ifall inte annat överenskommits med läkaren.