

FUNKTIONELL (URODYNAMISK) UNDERSÖKNING AV DE NEDRE URINVÄGARNA PÅ KIRURGISKA POLIKLINIKEN

I undersökningen mäts blåsans och urinrörets funktion elektroniskt.

Undersökningen görs för att konstatera urinorganens sjukdomar och funktionella störningar.

Förberedelse inför undersökningen

Ge urinprovet i enlighet med anvisningarna i kallelsebrevet. Om det konstateras inflammation i provet, får ni ett läkemedelsrecept hem och undersökningen uppskjuts.

I början av undersökningen mäts urinstrålens styrka (uroflow-undersökning). Före undersökningen bör ni dricka så mycket att ni har ett normalt urineringsbehov när ni kommer till undersökningen. Överdrivet drickande före undersökningen kan dock störa undersökningen och leda till missvisande resultat.

Ta med er de bifogade urineringslistorna när ni kommer till undersökningen. Listorna bör vara ifyllda för två dagar i enlighet med anvisningarna.

BEGRÄNSNINGAR

Mat och dryck Inga begränsningar

Läkemedelsbehandling Om ni använder läkemedel som har en inverkan på er blåsa, t.ex. Cystin, Detrusitol, Spasmo-lyt, Spasmo-lyt plus, Betmitga eller Vesicare bör ni sluta använda dem två veckor före undersökningen. Övriga läkemedel som ordinerats er kan ni ta som normalt. Om ni får besvärliga symptom utan ovannämnda läkemedel, kan ni fortsätta med läkemedelsbehandlingen tills ni kommer till undersökningen.

HEMVÅRDSANVISNINGAR

Under några dagar efter undersökningen kan det förekomma tätare urineringsbehov, sveda vid urinering eller små mängder blod i urinen. Drick lite mer än normalt. Om symptomen varar längre eller ni får hög feber, sök er till hälsovårdscentralsjouren.

Vid behov ger kirurgiska poliklinikens urologiska sjukskötare mer information mån-fre kl. 8.30-9.20 tfn 0400 145 577