

Operationsavdelningen (06) 826 4637
Öronpolikliniken (06) 826 4279
Samjouren 116 117

UTSTÅENDE ÖRON (OTAPOSTASIS)

Utstående öron (otapostasis) är den vanligaste av öronbladets utvecklingsstörningar.

Orsaken till felställning av öronbladet är missbildningar i broskvecket, i övre delen av öronbladet. Operationen görs oftast före skolåldern.

Syftet med operationen är att förbättra öronbladets ställning, få vacker form och ett bestående operationsresultat. Operationsmetoderna varierar, oftast görs operations- såret bakom örat, varefter man genom att minska brosket får broskvecket i rätt ställning. Operationsåret sys ihop. Örat skyddas med ett stadigt förband och barnet får en nätmössa som stöder det opererade örat.

Fortsatt vård

Barnet får i allmänhet åka hem samma dag som operationen gjorts. Vid behov reserveras bäddplats på sjukhuset.

För att få ett gott resultat, är det viktigt, att öronbladets ställning hålls korrekt med förband under flera veckor.

Öronförbandet och nätmössan bör hållas 3 dygn. Ifall det blir problem med förbandet, kan förbandet bytas enligt ordination på hälsocentralen.

Det är förbjudet att böja på öronen. Efter att förbandet tagits bort bör mössan, ett hårbånd eller tuben användas som stöd för örat dagtid i två veckor och på nätterna 3-4 veckor.

Efter operationen rekommenderas regelbunden smärtvård i 5-7 dagar och därefter smärtmedicin vid behov. Smärtmedicin minskar också svullnad.

Till skolan/dagvården kan barnet gå 3-4 dagar efter operationen. Fysisk ansträngning bör undvikas 10 dagar efter operationen.

Kontakta läkare

Operationsavdelningen (06) 826 4637

Öronpolikliniken (06) 826 4279

Samjouren 116 117

- inflammationssymtoms, feber över 38, svullnad, svår smärta.
- blödning eller dålig ställning av öronbladet